

内視鏡検査に関する説明書

【検査の前にご確認ください】

- 治療中の疾患により鎮静剤を使用できない、または内視鏡検査が中止になる場合があります。
- 授乳中の方は、事前に搾乳をお願いします。局所麻酔の影響で内視鏡検査後24時間は授乳ができません。

【お薬を服用されている方へ】

- 血圧の薬のみ当日朝6時までに内服してください。**その他の内服薬は、検査終了後に服用してください。
当日朝、内服した場合は胃内に薬が残るため、正確な検査ができない場合がありますのでご了承ください。
- 抗血小板薬・抗凝固薬を内服中の方は、主治医に休薬が必要か確認をお願いします。
当日朝、内服された方は病理組織検査を受けることができません。
- 喘息吸入薬を使用中の方は、かかりつけ医の指示に従ってください。(発作時の吸入薬もご持参ください)

内視鏡検査が中止になる方

- ◇当日の血圧が高値の方
- ◇当日、漢方薬・散剤・サプリメントを内服した方
- ◇当日、糖尿病治療薬の内服・注射をした方

鎮静剤の使用ができない方

- ◇検査後、運転の予定がある方（自動車・バイク・自転車）
- ◇鼻からの胃部内視鏡検査希望の方・S状結腸内視鏡検査を受ける方
- ◇血圧または脈拍が低値の方
- ◇閉塞隅角緑内障の方
- ◇緑内障疑い・または眼圧が高めの方^{注1}で、眼科で鎮静剤の使用について確認をしていない方
- ◇閉塞性肺機能障害(COPD・慢性気管支炎など)の方
- ◇睡眠時無呼吸症候群でCPAP療法中の方
- ◇慢性腎不全・透析治療中・肝硬変・肝不全の方
- ◇重症筋無力症の方
- ◇授乳中の方

※当日の症状や既往歴により、内視鏡検査前に診察が必要になる場合があります。

注1) 当日の眼圧で偶発的に高値となった方も対象になります。